

DS N°7 : Convexité et ln (2h)

① (2 points)

1. Déterminer la plus petite valeur de $n \in \mathbb{N}$ telle que :

$$\left(\frac{2}{3}\right)^n < 0,001$$

2. Déterminer la primitive sur l'intervalle I indiqué.

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{(x^3 + 3x + 1)^4} ; \text{ sur } I =]0; +\infty[.$$

Correction :

1. On résout l'inéquation :

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{3}\right)^n < 0,001 &\iff \ln\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n\right) < \ln(0,001) \quad (\text{on applique ln qui est strictement croissante}) \\ &\iff n \ln\left(\frac{2}{3}\right) < \ln(10^{-3}) \\ &\iff n > \frac{\ln(10^{-3})}{\ln\left(\frac{2}{3}\right)} \quad (\text{On divise par } \ln\left(\frac{2}{3}\right) < 0) \end{aligned}$$

Et $\frac{\ln(10^{-3})}{\ln\left(\frac{2}{3}\right)} \approx 17,036$, donc la plus petite valeur entière est $n = 18$.

2. On a pour $x > 0$:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{(x^3 + 3x + 1)^4} = \frac{1}{3} \times 3(x^2 + 1)(x^3 + 3x + 1)^{-4}$$

On reconnaît la forme $u'u^{-4}$, don une primitive de f sur I est :

$$F(x) = \frac{1}{3} \times \frac{(x^3 + 3x + 1)^{-3}}{-3} + K = -\frac{1}{9(x^3 + 3x + 1)^3} + K$$

où K est une constante réelle.

② (3 points) On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2.$$

On admet que pour tout entier naturel n , $u_n > 1$.

1. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par $v_n = \ln(u_n - 1)$.

- (a) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 2 dont on précisera le premier terme.

Correction :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \ln(u_{n+1} - 1) \\ &= \ln((u_n^2 - 2u_n + 2) - 1) \\ &= \ln(u_n^2 - 2u_n + 1) \\ &= \ln((u_n - 1)^2) \\ &= 2\ln(u_n - 1) \\ &= 2v_n \end{aligned}$$

Donc (v_n) est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme
 $v_0 = \ln(u_0 - 1) = \ln(3 - 1) = \ln 2$.

- (b) En déduire que, pour tout entier naturel n , $u_n = 1 + e^{2^n \times \ln 2}$.

Correction :

Comme (v_n) est géométrique de raison 2 et de premier terme $\ln 2$: on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = v_0 \times 2^n = 2^n \ln 2$$

D'autre part $v_n = \ln(u_n - 1)$, donc $e^{v_n} = u_n - 1$ et ainsi :

$$u_n = 1 + e^{v_n}$$

il s'en suit

$$u_n = 1 + e^{2^n \times \ln 2}$$

2. En déduire la limite de la suite (u_n) .

Correction :

On a $u_n = 1 + e^{2^n \ln 2}$.

Comme $\ln 2 > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n \ln 2 = +\infty$.


Par composition : $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{2^n \ln 2} = +\infty$.

Finalement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

- (III) (12 points)** On considère une fonction f définie et deux fois dérivable sur $] -2; +\infty [$. On note \mathcal{C}_f sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan, f' sa dérivée et f'' sa dérivée seconde.

On a tracé ci-dessous la courbe \mathcal{C}_f et sa tangente \mathcal{T} au point B d'abscisse -1 .

On précise que la droite \mathcal{T} passe par le point $A(0; -1)$.



Partie A : Exploitation du graphique

À l'aide du graphique, répondre aux questions ci-dessous.

- Préciser $f(-1)$ et $f'(-1)$.

Correction :

Graphiquement :

- $f(-1) = -2$.
- $f'(-1)$ est le coefficient directeur de la tangente \mathcal{T} passe par $A(0, -1)$ et $B(-1, -2)$.

$$f'(-1) = \frac{-1 - (-2)}{0 - (-1)} = 1$$

- La fonction f est-elle convexe sur son ensemble de définition ? Justifier.

Correction :

Non, la fonction f n'est pas convexe sur tout son ensemble de définition.

En effet, on observe graphiquement que :

- Pour $x > -1$, la courbe \mathcal{C}_f semble située au-dessus de ses tangentes (convexe)
- Pour $x < -1,5$, la courbe \mathcal{C}_f semble située au-dessous de ses tangentes (concave)

- Conjecturer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ et donner une valeur arrondie à 10^{-1} près d'une solution.

Correction :

Graphiquement, la courbe \mathcal{C}_f coupe l'axe des abscisses en un seul point pour $x \in [0; 0,2]$:
Donc on conjecture que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique racine qui a pour valeur approchée : $x \approx 0,1$.

Partie B : Étude de la fonction f

On considère que la fonction f est définie sur $]-2; +\infty[$ par

$$f(x) = x^2 + 2x - 1 + \ln(x+2),$$

1. Déterminer par le calcul la limite de la fonction f en -2 .

Interpréter graphiquement ce résultat.

On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Correction :

Limite en -2^+ :

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} (x^2 + 2x - 1) = -1$$

D'autre part :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$x + 2$	$-$	0	$+$

Donc $\lim_{x \rightarrow -2^+} x + 2 = 0^+$

et $\lim_{X \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty$.

Alors par composée avec $X = x + 2$, on a $\lim_{x \rightarrow -2^+} \ln(x + 2) = -\infty$

Finalement, par somme :

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty.$$

On déduit que la courbe \mathcal{C}_f admet une asymptote verticale d'équation $x = -2$.

2. Montrer que pour tout $x > -2$, $f'(x) = \frac{2x^2 + 6x + 5}{x + 2}$.

Correction :

Pour $x > -2$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x + 2 + \frac{1}{x + 2} \\ &= \frac{(2x + 2)(x + 2) + 1}{x + 2} \\ &= \frac{2x^2 + 6x + 5}{x + 2} \end{aligned}$$

3. Étudier les variations de la fonction f sur $]-2; +\infty[$ puis dresser son tableau de variations complet.

Correction :

Pour $x > -2$, on a $x + 2 > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui du numérateur $N(x) = 2x^2 + 6x + 5$ qui est une expression de degré 2.

Étude de $N(x)$:

$$\Delta = 36 - 40 = -4 < 0$$

Donc pour tout $x > -2$, $N(x) > 0$ (car $a = 2 > 0$).

Ainsi : $f'(x) > 0$ pour tout $x > -2$.

On déduit le tableau de variations :

x	-2^+	α	$+\infty$
$f'(x)$		+	
f		$-\infty$	$+ \infty$

4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -2; +\infty[$ et donner une valeur arrondie de α à 10^{-2} près.

Correction :

- f est continue sur $] -2; +\infty[$ (comme somme de fonctions continues)
- f est strictement croissante sur $] -2; +\infty[$ (car $f'(x) > 0$)
- $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $0 \in]-\infty; +\infty[$.

D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in] -2; +\infty[$.

D'après la calculatrice : $\alpha \approx 0,12$.

5. En déduire le signe de $f(x)$ sur $] -2; +\infty[$.

Correction :

D'après le tableau de variations de f , on déduit le tableau de signes de f :

x	-2	α	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

6. Montrer que \mathcal{C}_f admet un unique point d'inflexion et déterminer son abscisse.

Correction :

Calculons $f''(x)$: On a pour $x > -2$:

$$f'(x) = \frac{2x^2 + 6x + 5}{x + 2}$$

Donc :

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(4x + 6)(x + 2) - (2x^2 + 6x + 5)}{(x + 2)^2} \\ &= \frac{2x^2 + 8x + 7}{(x + 2)^2} \end{aligned}$$

Le dénominateur $(x + 2)^2 > 0$ pour $x > -2$, donc le signe de $f''(x)$ est celui de $N(x) = 2x^2 + 8x + 7$ qui est une expression de degré 2.

$$\Delta = 64 - 56 = 8$$

On a donc deux racines :

$$x_1 = \frac{-8 - \sqrt{8}}{4} = -2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx -2,707$$

$$x_2 = \frac{-8 + \sqrt{8}}{4} = -2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx -1,293$$

On a donc finalement le tableau suivant :

On a donc le tableau de convexité suivant :

x	-2	x_2	$+\infty$
$f''(x)$	—	0	+
Convexité de f	<i>concave</i>		<i>convexe</i>

D'après le tableau de convexité, on a un changement de courbure en x_2 , c'est donc l'abscisse de l'unique point d'inflexion : $x_2 = -2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ (Ça correspond bien au graphique).

7. On note F une primitive de f sur $] -2; +\infty[$.

Valider ou infirmer les affirmations suivantes en justifiant.

Affirmation 1 : F est une fonction croissante sur $] -2; +\infty[$.

Affirmation 2 : F est une fonction convexe sur $] -2; +\infty[$.

Correction :

Affirmation 1 :

F est une primitive de f , donc pour $x > -2$: $F'(x) = f(x)$.

D'après le tableau de signe de f :

- Sur $] -2; \alpha[$, $f(x) < 0$ donc $F'(x) < 0$: F décroissante
- Sur $\] \alpha; +\infty[$, $f(x) > 0$ donc $F'(x) > 0$: F croissante

Donc F n'est pas croissante sur tout l'intervalle. L'affirmation est FAUSSE.

Affirmation 2 :

$F''(x) = f'(x)$.

Or on a montré que $f'(x) > 0$ pour tout $x > -2$.

Donc $F''(x) > 0$ sur $] -2; +\infty[$, ce qui signifie que F est convexe sur cet intervalle.

L'affirmation est VRAIE.

Partie C : Une distance minimale

Soit g la fonction définie sur $] -2; +\infty[$ par


$$g(x) = \ln(x + 2).$$

On note \mathcal{C}_g sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, représentée ci-contre.

Soit M un point de \mathcal{C}_g d'abscisse x .

Le but de cette partie est de déterminer pour quelle valeur de x la distance JM est minimale.

On considère la fonction h définie sur $] -2; +\infty[$ par $h(x) = JM^2$.



- Justifier que pour tout $x > -2$, on a : $h(x) = x^2 + [\ln(x + 2) - 1]^2$.

Correction :

Dans le repère orthonormé, on a : $J(0, 1)$, et $M(x, g(x)) = (x, \ln(x + 2))$.

$$\text{Donc } \overrightarrow{JM} \begin{pmatrix} x \\ \ln(x + 2) - 1 \end{pmatrix}$$

Alors la distance JM est donnée par :

$$\begin{aligned} JM^2 &= x^2 + (\ln(x + 2) - 1)^2 \\ &= h(x) \end{aligned}$$

- On admet que la fonction h est dérivable sur $] -2; +\infty[$ et on note h' sa fonction dérivée.

- Montrer que pour tout réel $x > -2$,

$$h'(x) = \frac{2f(x)}{x + 2}$$

Correction :

Calculons $h'(x)$:

On a pour $x > -2$ et en vertu de la formule $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= 2x + 2[\ln(x + 2) - 1] \times \frac{1}{x + 2} \\ &= \frac{2x(x + 2) + 2[\ln(x + 2) - 1]}{x + 2} \\ &= \frac{2x^2 + 4x + 2\ln(x + 2) - 2}{x + 2} \\ &= \frac{2(x^2 + 2x - 1 + \ln(x + 2))}{x + 2} \\ &= \frac{2f(x)}{x + 2} \end{aligned}$$

- Dresser le tableau de variations de h sur $] -2; +\infty[$. Les limites ne sont pas demandées.

Correction :

Pour $x > -2$, $x + 2 > 0$, donc le signe de $h'(x)$ est celui de $f(x)$.

On a alors le tableau de variations suivant :

x	-2	α	$+\infty$
$h'(x)$	-	0	+
h		$h(\alpha)$	

- (c) En déduire que la valeur de x pour laquelle la distance JM est minimale est α où α est le nombre réel défini à la question 4 de la partie B.

Correction :

JM minimale quand JM^2 minimale et donc quand h est minimale.

Or, h admet donc un minimum en $x = \alpha$ d'après la question précédente. Ainsi la valeur de x pour laquelle la distance JM est minimale est α .

3. On notera M_α le point de \mathcal{C}_g d'abscisse α .

- (a) Montrer que $\ln(\alpha + 2) = 1 - 2\alpha - \alpha^2$.

Correction :

Par définition, α vérifie $f(\alpha) = 0$.

c'est-à-dire $\alpha^2 + 2\alpha - 1 + \ln(\alpha + 2) = 0$

et en isolant $\ln(\alpha + 2)$, on a :

$$\ln(\alpha + 2) = 1 - 2\alpha - \alpha^2$$

- (b) En déduire que la tangente à \mathcal{C}_g au point M_α et la droite (JM_α) sont perpendiculaires.

On pourra utiliser le fait que, dans un repère orthonormé, deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leurs coefficients directeurs est égal à -1 .

Correction :

Coefficient directeur de la tangente à \mathcal{C}_g en M_α :

$$g'(\alpha) = \frac{1}{\alpha + 2}$$

Et ainsi la tangente à \mathcal{C}_g en M_α a pour vecteur directeur : $\vec{u} \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ \frac{1}{\alpha+2} \end{smallmatrix} \right)$

la droite (JM_α) a pour vecteur directeur : $\overrightarrow{JM} \left(\begin{smallmatrix} \alpha \\ \ln(\alpha + 2) - 1 \end{smallmatrix} \right)$

Alors vérifions si ces vecteurs sont orthogonaux à l'aide du produit scalaire :

$$\begin{aligned}
\vec{u} \cdot \overrightarrow{JM} &= \alpha + \frac{1}{\alpha+2}(\ln(\alpha+2) - 1) \\
&= \frac{\alpha^2 + 2\alpha + \ln(\alpha+2) - 1}{\alpha+2} \\
&= \frac{f(\alpha)}{\alpha+2} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Ainsi les vecteurs sont orthogonaux et les droites sont perpendiculaires.

Méthode avec les coefficients directeurs

Coefficient directeur de la tangente :

$$m = g'(\alpha) = \frac{1}{\alpha+2}$$

Coefficient directeur de la droite (JM_α) :

$$\begin{aligned}
m_{JM_\alpha} &= \frac{y_m - y_J}{x_M - x_J} \\
&= \frac{g(\alpha) - 1}{\alpha - 0} \\
&= \frac{\ln(\alpha+2) - 1}{\alpha} \\
&= \frac{(1 - 2\alpha - \alpha^2) - 1}{\alpha} \quad (\text{d'après la question précédente}) \\
&= \frac{-2\alpha - \alpha^2}{\alpha} \\
&= -2 - \alpha \quad (\text{pour } \alpha \neq 0, \text{ ce qui est le cas car } \alpha \approx 0,31)
\end{aligned}$$

Produit des coefficients directeurs :

$$\begin{aligned}
m \times m_{JM} &= \frac{1}{\alpha+2} \times (-2 - \alpha) \\
&= \frac{-(2 + \alpha)}{\alpha + 2} \\
&= -1
\end{aligned}$$

Donc les deux droites sont perpendiculaires.